

# Grasidim 12% ЭМ.К

## Гербицид



**Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши юқори самарали гербицид!**

Таъсир этувчи моддаси	Клетодим 120 г/л
Препарат шакли	эмульсия концентрати
Сақлаш муддати	Қадоғи бузилмаган ҳолатда 3 йил
Сигими	5 литр

+998 93 592 01 43 | +998 97 146 11 18

[www.rainbowagro.com](http://www.rainbowagro.com)



**Rainbow**  
all about growing



### Кўлланиши:

Ѓўза, пиёз, картошка, помидор, кунгабоқар экинларидаги бошоқли бегона ўтларга қарши курашда қўлланиладиган ўзига хос ва юқори самарали гербицид. Бегона ўтларнинг нафақат ер усти қисмини, балки илдиз тизимини ҳам йўқотади. Экиннинг ривожланиш босқичлари ва об-ҳаво шароитларидан қатъий назар, самарали натижа кўрсатади. Ёпиштирувчи моддаларни қўшиб қўллаш талаб этилмайди. 40 дан ортиқ турдаги бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларни самарали назорат қилади. Таъсирининг яққол белгилари ишловдан 3-5 кундан сўнг ўсимликнинг ўсув органларининг ранги ўзгариши билан кўзга ташланади. Бошоқли бегона ўтларнинг бутунлай нобуд бўлиши 7-20 кун давомида содир бўлади.

### Афзалликлари:

- Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларни кенг кўламда назорат қилади;
- Бегона ўтларнинг нафақат ер усти қисмини, балки илдиз тизимини ҳам йўқотади;
- Экиннинг ривожланиш босқичлари ва об-ҳаво шароитларидан қатъий назар, самарали натижа кўрсатади;
- Таркибидаги сирт фаол моддаси препаратни бегона ўтнинг танасига тез сингиши ва тарқалишини таъминлайди.
- Пахта майдонларида қамиш, ажриқ, ғумайга қарши энг самарали гербицид.

### Сарф-меъёри ва қўллаш тартиби

Экин тури	Сарф-меъёри (л/га)	Бегона ўтлар	Қўллаш муддати ва усули	Ҳосилни йиғишга қанча қолгандан ишлов тугалланади (кун)	Мавсумда неча мартаба қўлланилади
Ѓўза	0.8-1.5	Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтлар	Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади	-	1