

Контактный фунгицид профилактического действия для защиты картофеля от фитофтороза.

Действующие вещества	Препаративная форма
Флуазинам, 500 г/л.	Концентрат суспензии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Сокращает до минимума риск раннего проявления фитофтороза и альтернариоза в благоприятных условиях для развития болезней
- Блокирует распространение первичной и вторичной инфекции, защищает здоровую листву и клубни
- Обеспечивает получение неповрежденных фитофторозом клубней в период уборки и во время хранения, при условии своевременного применения
- Обладает высокой устойчивостью к смыванию, обеспечивая стабильную защиту картофеля в условиях полива и обильных осадков
- Благодаря контактному механизму действия препятствует развитию резистентности

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Действующее вещество (флуазинам), входящее в состав фунгицида ПРЕГАРД относится к перспективному классу пиридинов. Флуазинам ингибирует процесс образования зооспор, а также формирование аппрессориев, тем самым предотвращает проникновение возбудителя в ткани растения блокируя сам процесс заражения.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Фитофтороз и альтернариоз картофеля.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Не менее 7–14 дней, в зависимости от степени инфекционной нагрузки, устойчивости сортов и погодно-климатических условий.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Препарат начинает защищать культуру сразу, с момента обработки.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

ПРЕГАРД не проявляет фитотоксичности по отношению к культурным растениям.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

ПРЕГАРД имеет контактное действие, что даёт возможность использовать его в антирезистентных системах защиты.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ

В каждом конкретном случае, особенно в смеси с микроудобрениями, необходима предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКАМ

Фунгицид следует применять до начала заражения. Профилактические обработки проводятся с интервалом 7–10 дней. ПРЕГАРД следует применять в фазу всходов до начала смыкания ботвы в рядке при высоком риске раннего фитофтороза с целью не допустить заражения молодых растений спорами патогенов, привезенными с семенным картофелем из хранилища, или перезимовавшим в поле в местах хранения отходов. Основной срок применения ПРЕГАРД - вскоре после окончания цветения, до отмирания ботвы. Прирост ботвы в этот период прекращается и основная цель фунгицидной обработки - защитить от заражения фитофторозом клубни нового урожая. Препарат обладает исключительно контактным действием и не накапливается в товарной продукции, в связи с чем может применяться на поздних стадиях развития культуры.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

ПРЕГАРД не имеет ограничений для последующих культур в севообороте.

ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА

Класс опасности для человека -2, для пчёл - 3.



УПАКОВКА

Канистра 5 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить препарат в специально предназначенных складских помещениях, в герметично закрытой заводской упаковке при температуре воздуха от +5 до +30 градусов С, вдали от источников возгорания. Беречь от прямого солнечного света. Не допускать замораживания.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Норма расхода, л/га, кг/га, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки в днях до сбора урожая, в () макс. кратность обработок
0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

