

Регламенты применения

| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода, л, кг/га | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработки) |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|
| Пшеница яровая | Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное) | 0,4-0,6 | Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |
| | Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, куриное просо) | 0,6-0,9 | Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |
| | Овсяг | 0,5-0,7 | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | |
| Пшеница озимая | Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, куриное просо) | 0,6-0,75 | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |